

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP 18-7-64 310256

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE STRASBOURG (Tél. 34-14-63

ABONNEMENT ANNUEL

Poste 93)

15 F.

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MOSELLE, VOSGES)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux : Cité Administrative, 2, Rue de l'Hôpital Militaire

STRASBOURG

C. C. P. : STRASBOURG 55-08-86

15 juillet 1964

Supplément n° 2 au Bulletin du mois de Juillet 1964

V I G N E

Avertissement

VERS DE LA GRAPPE - COCHYLIS-EUDEMIS

Les vols de deuxième génération des papillons de Cochylis et Eudemis ont été relativement importants et les premières chenilles pourront apparaître incessamment.

Le traitement doit être envisagé dans les conditions suivantes :

Produits à caractère préventif : (D.D.T., D.D.D., Rotenone, Arséniate) du 16 au 18 juillet

Produits à caractère curatif : du 20 au 23 juillet

Information

ARAIGNEES ROUGES - ACARIOSE - ERINOSE

Les générations estivales de ces acariens manifestent actuellement une reprise d'activité. Dans les secteurs intéressés (notamment dans les vignobles situés au Nord du département du Haut-Rhin où l'Araignée rouge est observée depuis quelques années) il nous paraît opportun de conseiller un traitement spécifique avec l'emploi d'un acaricide d'été reconnu efficace et ayant une bonne action ovicide. On opérera dans la période du 22 au 25 juillet.

Notons qu'il existe également des spécialités à la fois efficaces contre les Araignées rouges et les vers de la grappe.

198

...

ARBRES FRUITIERS

Avertissement

CARPOCAPSE

Les conditions actuelles restent favorables à l'évolution du Carpocapse. Compte-tenu des sorties échelonnées de papillons et de la présence de nouvelles pontes dans les vergers, il apparaît nécessaire de renouveler la protection insecticide dans la période du 17 au 21 juillet.

Information

TOUTES CULTURES

PUCERONS

Il est noté des importantes pullulations de pucerons sur de nombreuses cultures. Renouveler le traitement le cas échéant.

HOUBLON

MILDIOU

L'état sanitaire des plantations vis à vis du mildiou est satisfaisant. Toutefois, compte-tenu du stade végétatif actuel (début de la floraison), la protection doit être maintenue efficace.

Un nouveau traitement fongicide devra être réalisé dès réception de la présente note. Bien soigner la pulvérisation, une attaque de la maladie à cette période pouvant avoir de graves effets.

ACARIENS

Nous avons observé quelques foyers isolés d'Araignées rouges. En conséquence, il convient de surveiller les plantations afin de pouvoir opérer un traitement acaricide spécifique dès l'apparition des premiers symptômes.

Nous rappelons que l'emploi du Dimefox en arrosage au pied du houblon doit cesser deux mois avant la récolte. Par conséquent, ce produit ne peut plus être utilisé cette année.

Les contrôleurs :
J. BERNARD et C. GACHON

l'Inspecteur :
J. HARRANGER

Imprimerie de la Station de Strasbourg - Directeur-Gérant : L. BOUYX.